

Aciclovir 5%

ratiopharm CONSEIL®

Voie cutanée
Crème
Tube de 2g



Bouton de fièvre



Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ceci est un médicament autorisé et contrôlé (voir N° d'identification sur l'emballage extérieur)
- Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
- Si les symptômes persistent au-delà de 10 jours, ou s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent, consulter votre médecin.
- Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez-la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème ?
3. Comment utiliser ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème ?
6. Informations supplémentaires.

1 QU'EST-CE QU'ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIVIRAUX, Code ATC : D06BB03.
Ce médicament est indiqué dans le traitement des poussées d'herpès labial localisé (appelé aussi "boutons de fièvre"), chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème ?

N'utilisez jamais ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème dans les cas suivants :

- chez l'enfant de moins de 6 ans,
- allergie connue à l'aciclovir ou à l'un des autres composants de ce médicament (voir rubrique "Que contient ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème ?").

Faites attention avec ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème :

Prenez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin en cas de doute sur la nature de votre lésion.

Chez les patients dont les fonctions immunitaires sont diminuées: il est impératif de consulter leur médecin avant d'utiliser ce médicament.

En l'absence de cicatrisation au bout de 10 jours de traitement ou d'aggravation de votre bouton de fièvre : arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin.

Afin d'éviter des irritations locales, ne pas appliquer la crème sur la muqueuse (buccale, vaginale ou oculaire). Éviter le contact accidentel avec les yeux.

En cas de poussée d'herpès labial, quelques précautions d'hygiène s'imposent, pour protéger votre entourage du risque de transmission du virus :

- évitez le contact rapproché, un baiser par exemple, avec votre entourage,
- N'EMBRASSEZ JAMAIS UN ENFANT EN BAS ÂGE,
- lavez-vous soigneusement les mains en cas de contact avec la lésion,
- au cours du traitement, afin de ne pas propager les lésions, ne frottez ni vos yeux ni vos paupières avec vos mains et si vous portez des lentilles de contact, ne les humidifiez jamais avec votre salive,
- évitez de toucher ou de gratter les lésions.

En cas d'une autre localisation de votre crise d'herpès, n'utilisez jamais cette crème.

PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN.

Ce médicament contient du propylène glycol et peut provoquer des irritations de la peau.

Ce médicament contient de l'alcool cétyle et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Il est déconseillé d'utiliser ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème, avec d'autres crèmes. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

En conséquence, l'utilisation d'aciclovir par voie cutanée est possible chez la femme enceinte dans le respect des indications.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, prévenez votre médecin car lui seul pourra juger de la nécessité de le poursuivre.

Allaitement

Si la pathologie maternelle le permet, l'allaitement est possible avec ce médicament. D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Informations importantes concernant certains composants de ACICLOVIR ratiopharm CONSEIL® 5 %, crème :

Liste des excipients à effet notoire : propylène glycol, alcool cétyle.

