

Bétadine Scrub 4% (povidone iodée)

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

1/- QU'EST-CE QUE BETADINE Scrub 4% ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ? Antiseptiques et désinfectants. Ce médicament est un antiseptique à base d'iode, il est indiqué pour : - le traitement local d'appoint et le nettoyage des affections de la peau et des muqueuses, infectées ou risquant de s'infecter. – Lavage antiseptique des mains du personnel soignant et des mains du chirurgien. – Lavage antiseptique préopératoire.

Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Bétadine Scrub 4% ? N'utilisez jamais Bétadine Scrub 4% : - en cas d'usage répété, à partir du 2^{ème} trimestre de grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement. – Pour le nouveau-né de moins de 1 mois, - pour la désinfection du matériel médico-chirurgical. – en association avec les antiseptiques dérivés du mercure. – en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants, en particulier la povidone. Il n'existe pas de réactions croisées avec les produits de contraste iodés. Les antécédents d'accidents de type allergique aux produits de contraste iodés ou d'anaphylaxie (possibilité de réaction allergique) aux fruits de mer ne constituent pas une contre-indication à l'utilisation de ce médicament.

Mise en garde spéciale : l'iode contenu dans ce médicament peut traverser la peau, en particulier en cas d'usage répété ou sur certaines peaux fragiles ou fragilisées et passer dans la circulation générale (voir rubrique 4). Une attention spéciale est nécessaire lors d'applications régulières réalisées sur peau lésée chez des patients présentant une insuffisance rénale, en particulier chez les grands brûlés (voir rubrique 4). L'utilisation chez l'enfant de moins de 2.5 ans nécessite l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. EN cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi : rincer après usage.

Prise ou utilisation d'autres médicaments : Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse : en raison de la présence d'iode, l'utilisation de ce médicament est contre-indiquée à partir du 2^{ème} trimestre de la grossesse, en cas d'usage répété. Il ne sera utilisé à titre occasionnel que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement : l'allaitement est contre-indiqué en cas d'usage répété de ce médicament. Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

3- Comment utiliser Bétadine Scrub 4% ? Voie cutanée. Lavage hygiénique des mains : le produit s'utilise pur à raison de 4 ml versés sur les mains préalablement mouillées. Frotter pendant 1 mn et rincer soigneusement à l'eau. Lavage chirurgical des mains : renouveler ce protocole pendant 3 à 5 mn, sur les mains et les avant-bras. Lavage des plaies souillées : utiliser le produit dilué au tiers.

Rincer soigneusement à l'eau. Préparation de l'opéré : la préparation de l'opéré doit être effectuée moins de deux heures avant l'intervention, avec 60 ml de produit pur : - mouiller la tête, les cheveux et l'ensemble du corps sous la douche, - effectuer le lavage antiseptique en quatre temps. Frotter jusqu'à décoloration de la mousse : 1. La tête et les cheveux avec 10 ml de Bétadine Scrub 4%. Ne pas rincer. 2. Le tronc et les membres supérieurs avec 10 ml de Bétadine Scrub 4%, en insistant au niveau des aisselles et du nombril. Ne pas rincer. 3. La région génitale et les membres inférieurs avec 10 ml de Bétadine Scrub 4%, en insistant au niveau des organes génitaux, du pli interfessier et entre les orteils. Ne pas rincer. 4. Puis rincer abondamment l'ensemble du corps – renouveler les opérations de lavage en respectant le même protocole, puis sécher avec une serviette propre et mettre des vêtements propres. Conduite à tenir en cas de surdosage : en cas d'ingestion orale massive, contacter rapidement un médecin.

4- Quels sont les effets indésirables éventuels ? Comme tous les médicaments, Bétadine Dermique 10% est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet : - en cas d'usage répété et prolongé sur certaines peaux fragiles ou fragilisées, notamment chez le prématuré et le grand brûlé, il peut se produire une surcharge en iode susceptible de modifier le fonctionnement de la glande thyroïde, - possibilité d'irritation de la peau et de réaction allergique locale, - une coloration réversible et transitoire peut apparaître sur la peau, - exceptionnellement des réactions d'allergie générale : urticaire, œdème de Quincke, choc d'origine allergique, ont été décrites avec des produits contenant de la povidone dont Bétadine Dermique 10%, - en cas d'usage sur de larges surfaces et chez les grands brûlés, des effets généraux tels que des troubles de la fonction rénale ont été observés. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet indésirable non mentionné ou gênant.

5- Comment conserver Bétadine Dermique 10% ? Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le flacon. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

6- Informations supplémentaires : que contient Bétadine Scrub 4% ? La substance active est : povidone iodée 4.0 g pour 100 ml. Les autres composants sont : solution à 60% de sel d'ammonium de l'ester sulfurique d'alkylphénoxyéthylène éthane, bis (hydroxyéthyl) lauramide, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Qu'est ce Bétadine Scrub 4% et contenu du flacon ? solution pour application cutanée. Flacon de 125 ml.

Dernière date d'approbation de cette notice : 12/2009

Titulaire et exploitant : Meda Pharma 25 bd de l'amiral bruix 75016 – paris tél. 0456641070 sous licence NAPP

Fabricant : MEDA Manufacturing

Av JFK – 33700 Mérignac

Médicament autorisé n° : 3400930108611

