

## **BISEPTINE®**, solution pour application locale

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez une doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.**
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.**
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.**
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin**

### **1- Qu'est ce BISEPTINE® ?**

**Antiseptiques et désinfectants(D.dermatologie)**

**Ce médicament est indiqué pour :**

- L'antisepsie des plaies chirurgicales et traumatique peu profondes**
- Le traitement local d'appoint des affections de la peau, infectées ou risquant de s'infecter**
- L'antisepsie de la peau avant une opération**

### **2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser BISEPTINE® ?**

**N'utilisez jamais BISEPTINE® dans les cas suivants :**

- En cas d'allergie connue à l'un des constituants, en particulier à la chlorhexidine ou à la famille des ammoniums quaternaires.**
- Dans le conduit auditif en cas de perforation tympanique, ni dans les yeux**
- Sur les muqueuses en particulier génitales**
- Pour la désinfection du matériel médico-chirurgical.**

**En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien**

### **Faites attention avec BISEPTINE®**

#### **Mises en garde spéciales**

- Laisser sécher avant utilisation d'un instrument électrique en raison d'un risque de brûlure**
- Ne pas utiliser sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau profondément brûlée, une peau de prématuré ou de nourrisson, en raison des risques de passage dans la circulation générale.**
- Ce médicament n'est qu'un antiseptique local. Son action diminue seulement le nombre de microorganismes.**

#### **Précautions d'emploi.**

- Eviter l'emploi simultané ou successif d'autres antiseptiques.**
- Utiliser proprement car dès l'ouverture d'une préparation antiseptique, une contamination microbienne est possible En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**
- Ne jamais laisser à la portée des enfants.**
- Ne pas avaler**

### **Interactions avec d'autres médicaments**

- Eviter l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques différents avec cet antiseptique (notamment l'utilisation préalable de savon doit être suivie d'un rinçage soigneux)
- Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Grossesse et allaitement**

**Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser tout médicament**

### **3- Comment utiliser BISEPTINE® ?**

#### **Posologie :**

**Peau lésée : en règle générale 1 application, 2 fois par jour**

**Préparation de la peau saine pour la chirurgie : 2 applications successives correspondant respectivement à la phase de nettoyage/détersion et à la phase d'antisepsie Dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription médicale**

#### **Mode et voie d'administration :**

**voie cutanée. Ne pas avaler**

#### **Durée du traitement :**

**dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription médicale**

### **4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?**

**Comme tous les médicaments, BISEPTINE® est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.**

#### **Possibilité :**

- D'eczéma allergique au contact du produit, d'autant plus qu'il s'agit de peau lésée, de muqueuse ou d'ulcérations des membres inférieurs.
- Rarement, d'accident allergique général.

**Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.**

### **5- Comment conserver BISEPTINE® ?**

**Tenir hors de la portée et de la vue des enfants**

**Ne pas utiliser BISEPTINE® après la date de péremption mentionnée sur le flacon.**

**Pour les flacons en polyéthylène : pas de précautions particulières de conservation.**

**Pour les flacons pulvérisateurs en polyéthylène : à conserver à une température ne dépassant pas 25°C**

**6- Informations supplémentaires Que contient BISEPTINE® ?**

**Les substances actives sont : Gluconate de chlorhexidine 0,250 g, chlorure de benzalkonium 0,025g, alcool benzylique 4 ml pour 100 ml de solution.**

**L'autre composant est : l'eau purifiée**

**Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale. Flacon pulvérisateur 100ml ou flacon de 40, 250 ou 500 ml.**

**Titulaire et exploitant Bayer santé familiale 33 rue de l'industrie - 74 240 Gaillard – France  
Fabricant KVP GMBH Projensdorfer Str.324 24106 KIEL – Allemagne**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27 juillet 2010.**

**Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France)**