

CARBOSYLANE, gélule

Charbon activé, Siméticone

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARBOSYLANE, gélule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARBOSYLANE, gélule ?
3. Comment prendre CARBOSYLANE, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARBOSYLANE, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARBOSYLANE, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTIFLATULENT/ADSORBANT INTESTINAL

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des états dyspeptiques (digestion difficile) et du météorisme (ballonnement intestinal).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARBOSYLANE, gélule?

Ne prenez jamais CARBOSYLANE, gélule dans les cas suivants :

- Allergie à l'un des constituants.
- chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec CARBOSYLANE, gélule :

Si vous suivez un traitement avec des digitaliques, prenez CARBOSYLANE, gélule à distance des digitaliques (plus de 2 heures, si possible).

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Ce médicament pouvant diminuer l'absorption d'autres médicaments, ceux-ci doivent être administrés à distance de lui. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre. Ce médicament peut être prescrit pendant l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT PRENDRE CARBOSYLANE, gélule ?

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Ce médicament se présente sous forme d'une gélule bleue gastro-soluble (dont les principes actifs sont libérés dans l'estomac) et d'une gélule rouge gastro-résistante (dont les principes actifs sont libérés dans l'intestin) à prendre simultanément.

La posologie habituelle est de 3 doses (une dose = 1 gélule rouge + 1 gélule bleue) par jour.

Mode d'administration : Voie orale.

Fréquence d'administration : Ce médicament doit être pris de préférence au moment des repas.

Durée du traitement : La durée du traitement varie en fonction de la symptomatologie.

Si vous avez pris plus de CARBOSYLANE, gélule que vous n'auriez dû :

A des doses élevées, une coloration noire des selles est possible.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CARBOSYLANE, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Une coloration noire des selles peut apparaître,
- Des cas de réactions allergiques (urticaire, réaction allergique généralisée) ont été rapportés suite à l'administration de CARBOSYLANE, gélule.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER CARBOSYLANE, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CARBOSYLANE, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient CARBOSYLANE, gélule ?

Les substances actives sont :

Charbon activé 140 mg
Siméticone 45 mg

Pour une gélule bleue ou rouge.

Les autres composants sont :

Oléate de sorbitan et polysorbate 80.

Enveloppe de la gélule bleue : Gélatine, indigotine (E132), dioxyde de titane (E171).

Enveloppe de la gélule rouge : Gélatine, érythrosine (E127), dioxyde de titane (E171), indigotine (E132).

Enrobage gastro-résistant de la gélule rouge : Acétate phthalate de cellulose, phthalate de diéthyle.

Qu'est ce que CARBOSYLANE, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule. Boîtes de 48 (soit 24 doses) ou 96 (soit 48 doses).

Titulaire/ Exploitant

Laboratoires GRIMBERG

19 RUE POLIVEAU

75005 PARIS - France

Fabricant

Laboratoires GRIMBERG

ZA DES BOUTRIES

5 RUE VERMONT

78704 CONFLANS SAINTES HONORINE Cedex - France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 27 septembre 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).