

## COQUELUSEDAL NOURRISSON suppositoire

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

### Composition

Substances actives :

Extrait hydroalcoolique mou de grindélia, Extrait hydroalcoolique mou de gelsémium.

Autres composants : propylène glycol, glycérides hémisynthétiques solides.

Boîte de 10 suppositoires.

**Titulaire/Exploitant/Fabricant :** Laboratoires ELERTE.

181-183, rue André Karman, 93300 Aubervilliers, France. Tél : +33(0)1 48 34 75 03

### 1. QU'EST-CE QUE COQUELUSEDAL NOURRISSON ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament de phytothérapie. Ce médicament est traditionnellement utilisé au cours des affections bronchiques aiguës bénignes.

**Attention :** si les troubles persistent, consulter votre médecin.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT D'UTILISER COQUELUSEDAL NOURRISSON ?

**N'utilisez jamais COQUELUSEDAL NOURRISSON** en cas de lésions récentes de l'anus ou du rectum (contre-indication liée à la voie d'administration).

**Faites attention dans les cas suivants :** en cas d'apparition de fièvre, d'une expectoration grasse ou purulente, ou en cas de maladie chronique des bronches et des poumons, demander l'avis de votre médecin.

**Liste des excipients à effet notable :** propylène glycol.

**Utilisation avec d'autres médicaments :** veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

### 3. COMMENT PRENDRE COQUELUSEDAL NOURRISSON ?

**Posologie :** 1 à 2 suppositoires par jour.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Durée du traitement :** l'utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en raison des risques de toxicité locale.

**Mode d'administration :** Voie rectale. Réservé au nourrisson jusqu'à 30 mois.

**Si vous avez utilisé plus de COQUELUSEDAL NOURRISSON que vous n'auriez dû :** la forme suppositoire rend cette éventualité improbable.

**Si vous oubliez d'utiliser COQUELUSEDAL NOURRISSON :** ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, COQUELUSEDAL NOURRISSON est susceptible d'avoir des effets indésirables. Des effets locaux (irritation de l'anus ou du rectum), liés à la voie d'administration, peuvent être observés. Ils sont d'autant plus fréquents et intenses que la durée d'utilisation est prolongée, le rythme d'administration et la posologie élevés.

En raison de la présence de propylène glycol, risque d'irritation cutanée.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER COQUELUSEDAL NOURRISSON ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 14 août 2006.