



Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 3 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CortiSéderym 0,5 %, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CortiSéderym 0,5 %, crème ?
3. Comment utiliser CortiSéderym 0,5 %, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CortiSéderym 0,5 %, crème ?
6. Informations supplémentaires



1. Qu'est-ce que CortiSéderym 0,5 %, crème et dans quels cas est-il utilisé ?

Ce médicament contient un corticoïde.

Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de :

- Piqûres d'orties,
- Piqûres d'insectes,
- Coups de soleil localisés.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CortiSéderym 0,5 %, crème ?

N'utilisez jamais pour vous (ou votre enfant) CortiSéderym 0,5 %, crème :

- si vous êtes allergique à l'hydrocortisone ou à l'un des autres composants contenus dans CortiSéderym 0,5%, crème. Pour la liste complète des composants : voir rubrique 6,
- sur des plaies,
- sur une acné,
- sur une rosacée (rougeur permanente au niveau du visage),
- sur une peau infectée, que l'origine soit bactérienne (par exemple impétigo), virale (herpès, zona, varicelle), mycosique (due à des champignons microscopiques) ou parasitaire.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Faites attention avec CortiSéderym 0,5 %, crème :

- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

- En cas d'apparition de cloques après un coup de soleil, consultez votre médecin avant l'application du produit.
- Ce médicament contient un corticoïde, respectez le mode d'utilisation. En effet, une augmentation de la quantité appliquée et/ou du nombre d'applications n'améliorerait ni l'activité, ni la rapidité d'action du produit mais pourrait provoquer des effets indésirables.
 - Ne traitez pas de grandes surfaces.
 - Ne pas recouvrir d'un pansement fermé (pansement occlusif), car cela pourrait entraîner le passage d'une partie du principe actif dans le sang.
 - N'appliquez pas d'autres produits à usage dermatologique sur la surface traitée.
 - Ne pas utiliser plus de 2 fois par jour.
 - Ne dépassez pas la durée d'utilisation recommandée (3 jours).

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours de traitement, prenez l'avis de votre médecin.

- En cas de :
 - Intolérance locale,
 - Irritation, surinfection cutanée.
 Interrompez le traitement et consultez votre médecin.
- Ce médicament contient de l'alcool stéarylique, de l'alcool cétylique et de la graisse de laine qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, notamment s'il s'agit d'un traitement dermatologique.

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

Ne pas appliquer sur les seins lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants de CortiSéderym 0,5 %, crème.

Ce médicament contient de l'alcool stéarylique, de l'alcool cétylique et de la graisse de laine qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales (par exemple : eczéma).

3. Comment utiliser CortiSéderym 0,5 %, crème ?

Posologie/Fréquence d'administration

- Appliquez la crème 2 fois par jour, matin et soir.
- Appliquez le produit en couche mince, puis étalez-le en massant légèrement jusqu'à ce qu'il soit entièrement absorbé.

- Lavez-vous les mains après l'application.

Durée de traitement

La durée d'utilisation est limitée à 3 jours.

La persistance des symptômes au-delà de 3 jours nécessite de prendre un avis médical.

Mode d'administration

Voie cutanée.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, CortiSéderym 0,5 %, crème, est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Risque d'amincissement de la peau, de dilatation de petits vaisseaux sanguins, de vergetures, de poussée d'acné, de rougeurs et d'irritations autour de la bouche.
- Des cas de développement exagéré du système pileux, de trouble de la coloration de la peau, d'infection secondaire, en particulier en cas de traitement prolongé, sous pansement occlusif ou dans les plis, ont été rapportés.
- En raison de la présence de graisse de laine, risque d'eczéma (réaction allergique de la peau).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver CortiSéderym 0,5 %, crème ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser CortiSéderym 0,5 %, crème après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas +30°C. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Que contient CortiSéderym 0,5 %, crème ?

La substance active est :
Hydrocortisone 0,50 g
Pour 100 g de crème.

Les autres composants sont : alcool stéarylique, alcool cétylique, alcool isopropylique, graisse de laine, stéarate de macrogol 1000, stéarate de macrogol 4000, stéarate de macrogol 6000, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Ce médicament se présente sous forme de crème.
Tube de 15 g.

Titulaire - Exploitant - Fabricant
COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 4 février 2004.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Assaps (France).

AN12020001-V01