

DAKIN COOPER®

STABILISÉ

• COMPOSITION :

Solution concentrée d'hypochlorite de sodium quantité correspondant à chlore actif 0,5 g pour 100 ml. Permanganate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, eau purifiée.

• INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Antiseptique local préconisé dans l'antisepsie de la peau, des muqueuses et des plaies. Usage externe.

À utiliser pur en lavages, bains locaux, irrigations, ou en compresses imbibées ou pansements humides. Renouveler les applications selon les besoins. **Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Lire attentivement la notice avant utilisation.**

À conserver à une température inférieure à 30°C.

Médicament non soumis à prescription médicale.



Médicament autorisé n° 3400933145323

OUVRIRE ICI ➔

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

• COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Solution concentrée d'hypochlorite de sodium quantité correspondant à chlore actif : 0,500 g pour 100 ml. Permanganate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, eau purifiée.

• FORME PHARMACEUTIQUE :

Solution pour application locale : flacon en polyéthylène de 60 ml, 250 ml, 500 ml.

• CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :

Antiseptique (D : Dermatologie)

• TITULAIRE / EXPLOITANT :

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Place L. Auvert - 77020 Melun Cedex

• FABRICANT :

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE

FRANÇAISE - Rue de la Saussaie

77310 St Fargeau-Ponthierry

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

(indications thérapeutiques)

Ce médicament est un antiseptique local à usage externe.

Ce médicament est préconisé dans :

- l'antisepsie de la peau et des muqueuses,
- l'antisepsie des plaies

ATTENTION !

- **DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?**

EN CAS DE DOUTE , IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas avaler. Ne pas utiliser en même temps qu'un autre antiseptique.

Attention : risque de décoloration de certaines fibres textiles.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

• INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques ou de savon est à éviter sans un rinçage soigneux intermédiaire.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

• GROSSESSE - ALLAITEMENT :

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

- **POSOLOGIE** : Les applications locales de **DAKIN COOPER® STABILISÉ** se font sans dilution, soit :

- en lavages (ex : lavage des plaies),
- en bains locaux (ex : bains de doigts, de pieds, de siège),
- en irrigations,
- en compresses imbibées ou en pansements humides.

Renouveler les applications selon les besoins.

- **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION** : Usage externe.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas d'ingestion accidentelle, l'antidote est le bicarbonate de sodium.

EFFETS NON SOUHAITÉS

ET GÊNANTS :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- Possibilité de sensations de brûlures ou d'irritation (en cas de plaies importantes ou en chirurgie gynécologique) ; ceci est habituellement sans conséquence et ne doit en général pas faire modifier le traitement.
- Risque d'effet irritatif sous occlusion prolongée.

SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le flacon.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

DE CONSERVATION :

À conserver à une température inférieure à 30°C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :

Février 2005



8009093/00