

# Diaretyl®

## DIARRHÉE AIGÜE

Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMÉDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles imposent de prendre un avis médical.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.

### IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

**DÉNOMINATION :** DIARETYL 2mg, gélule

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Chlorhydrate de loperamide.....2,00mg  
(quantité correspondant à loperamide base.....1,86 mg)  
Excipients : Amidon de maïs, cellulose microcristalline, talc..... pour une gélule.

**FORME PHARMACEUTIQUE :** Gélule – Boîte de 12.

**CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :** ANTI-DIARRHEIQUE (A : Appareil digestif et métabolisme)

**TITULAIRE / EXPLOITANT :**

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE - Place Lucien Auvert – 77020 MELUN Cedex

**FABRICANT :** DELPHARM - Usine du Petit Paris – 91731 BRETIGNY-SUR-ORGE

### DANS QUELS CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Traitement de courte durée des diarrhées aiguës passagères de l'adulte (à partir de 15 ans). Ce traitement est un complément des mesures diététiques : lire attentivement le chapitre « Précautions d'emploi ».

### ATTENTION !

#### DANS QUELS CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MÉDICAMENT :

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE CE MÉDICAMENT :

- si vous souffrez d'une maladie chronique de l'intestin et du côlon, notamment au cours des poussées aiguës de rectocolite hémorragique.
- en cas d'allergie à l'un des constituants de la gélule

EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE SPECIALES :

**ATTENTION :** vous ne devez pas prendre ce médicament :

- en cas de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- si votre diarrhée survient au cours d'un traitement antibiotique (risque d'atteinte sévère du côlon).

De même vous devez arrêter ce traitement et consulter rapidement votre médecin dans les cas suivants :

- en cas de fièvre, de vomissement,
- en cas de présence de sang ou de glaires dans les selles,
- en l'absence d'amélioration au bout de deux jours de traitement,
- en cas de constipation ou de distension abdominale,
- en cas de soif intense, de sensation de langue sèche. En effet, ces signes montrent un début de déshydratation, c'est-à-dire de perte importante de liquide, due à la diarrhée. Votre médecin jugera alors de la nécessité de prescrire une réhydratation qui pourra se faire par voie orale ou par voie intraveineuse.

### N'UTILISER CE MÉDICAMENT QU'AVEC PRÉCAUTION (PRÉCAUTIONS D'EMPLOI)

PRENEZ L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN en cas de maladie du foie car une surveillance médicale pendant le traitement est nécessaire. La diarrhée entraîne une perte de liquide et de sels minéraux. Il est nécessaire de :

- se réhydrater par des boissons abondantes, salées ou sucrées, afin de compenser les pertes de liquides dues à la diarrhée (boire au moins 2 litres) ;
- s'alimenter le temps de la diarrhée :
  - Supprimer les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés, ainsi que les aliments ou boissons glacés.
  - Privilégier les viandes grillées, le riz.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS NOCIVES ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT TRAITEMENT EN COURS.

Ce médicament contient du LOPERAMIDE. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir « Mode d'emploi » et « Posologie »).

### SI VOUS ÊTES ENCEINTE OU SI VOUS ALLAITEZ :

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.

L'allaitement demeure possible en cas de traitement bref par ce médicament.

### CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES :

Attention ! Ce médicament provoque parfois une somnolence discrète et transitoire ou des vertiges risquant d'être dangereux lors de la conduite de véhicules et de l'utilisation de certaines machines.

### COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT :

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant (moins de 15 ans)

### POSOLOGIE :

Réservé à l'adulte (à partir de 15 ans)

- Commencez par 2 gélules en une seule prise (soit 4 mg de loperamide)
- Si la diarrhée continue : après chaque selle non moulée, prenez 1 gélule supplémentaire, mais :
  - Ne jamais dépasser 6 gélules par jour,
  - Ne jamais dépasser 2 jours de traitement

### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION : Voie orale.

Avaler les gélules à l'aide d'un verre d'eau.

### ESPACEZ LES PRISES

Prenez 1 gélule après chaque selle non moulée, mais :

- Ne jamais dépasser 6 gélules par jour,
- Ne jamais dépasser 2 jours de traitement

### DURÉE DU TRAITEMENT :

La durée d'utilisation est limitée à 2 jours.

### CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas de surdosage accidentel, ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MÉDECIN.

### QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS DU MÉDICAMENT

CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS :

- Constipation et/ou distension du ventre
- Douleurs du ventre, ballonnements, nausées, vomissements, sécheresse de la bouche,
- Réactions allergiques (éruption cutanée, urticaire et exceptionnellement choc allergique grave),
- Fatigue, somnolence, vertiges.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

### CONSERVATION :

NE LE PRENEZ PAS APRÈS LA DATE LIMITE D'UTILISATION INSCRITE SUR L'EMBALLAGE.

CONSERVEZ CE MÉDICAMENT à une température ne dépassant pas 30°C.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

### DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Décembre 2000.

 COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE  
Place Lucien Auvert – 77020 MELUN Cedex

400400123