



dolodent

Solution gingivale

DOLODENT, solution gingivale
Chlorhydrate d'Amyléine

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre DOLODENT, solution gingivale car elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 - Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
 - Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DOLODENT, solution gingivale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DOLODENT, solution gingivale ?
3. Comment utiliser DOLODENT, solution gingivale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DOLODENT, solution gingivale ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu'est-ce que DOLODENT, solution gingivale et dans quels cas est-il utilisé ?

Préparation pour l'odonto-stomatologie - traitement local à visée antiseptique et antalgique.

DOLODENT, solution gingivale est préconisé en application locale en cas de douleurs des gencives lors des poussées dentaires.

Fréquence d'administration :

Deux à trois applications par jour.

Durée du traitement :

Le traitement ne devra pas dépasser 5 jours sans avis médical.

Si vous avez pris plus de DOLODENT, solution gingivale que vous n'auriez dû :

Un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation de cette solution gingivale.

Si vous oubliez de prendre DOLODENT, solution gingivale :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments DOLODENT, solution gingivale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Possibilité de réactions allergiques : réactions cutanées, gonflement du visage, dans ce cas, arrêtez le traitement et prévenir le médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver DOLODENT, solution gingivale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser DOLODENT, solution gingivale après la date de péremption mentionnée sur le flacon. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DOLODENT, solution gingivale ?

N'utilisez jamais DOLODENT, solution gingivale en cas d'allergie connue aux anesthésiques locaux ou aux autres constituants.

Faites attention avec DOLODENT, solution gingivale :

- Respectez les conseils d'utilisation et la posologie préconisée dans cette notice.
- Consultez votre médecin en cas d'aggravation des symptômes (en particulier, si la fièvre augmente, si la douleur est importante).
- Consultez votre médecin en l'absence d'amélioration au bout de 5 jours.
- Ne pas utiliser de façon prolongée en raison de la présence d'un anesthésique local (Chlorhydrate d'amyléine).

Prise d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs :

L'attention des sportifs est attirée sur le fait que DOLODENT, solution gingivale contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

3. Comment utiliser DOLODENT, solution gingivale ?

Un avis médical doit être demandé avant l'application de DOLODENT, solution gingivale.

Posologie :

Deux à trois applications par jour sur la gencive douloureuse en massant doucement avec le doigt propre.

Mode et voie d'administration :

Usage local strict. Voie gingivale.
DOLODENT, solution gingivale doit être appliqué localement.
Ne pas avaler.
Nettoyer le bouton poussoir après chaque utilisation et remettre le capot.

6. Informations supplémentaires

Que contient DOLODENT, solution gingivale ?

La substance active est :
Chlorhydrate d'amyléine.....0,75 g
Pour 100 g de solution.

Les autres composants sont :

Glucose liquide, miel, glycérol, acide ascorbique, arôme caramél (monopropylène glycol, eau, vanilline, pipéronal, maltol, acide lactique, MCP hydratée, acétylméthylcarbinol, dodécylactone delta, heptalactone gamma, triacétine), eau purifiée.

Qu'est-ce que DOLODENT, solution gingivale et contenu de l'emballage extérieur ?

Solution gingivale, 27g en flacon (PETG) muni d'une pompe et surmonté d'un capot.

Titulaire / Exploitant / Fabricant

LABORATOIRES GILBERT
928 Avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint - Clair

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est :
Décembre 2011

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France) : www.ansm.sante.fr



Les Laboratoires Gilbert cotisent à Adelphe pour les emballages de médicaments vendus en officine.
Les Laboratoires Gilbert participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.
Les Laboratoires Gilbert vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.



EM 02/2012
AN1156 0023

