# Dosoxygénée 10 volumes

## Stérile

Peroxyde d'hydrogène à 3 %

Solution pour application cutanée en récipient unidose.

#### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un antiseptique local à usage externe (pour la peau). Ce médicament est préconisé :

pour le nettoyage à visée antiseptique de la peau érodée et des petites plaies.

pour les saignements des petites plaies superficielles.

Employer l'eau oxygénée pure à 10 volumes pour le nettoyage de la peau lésée et des petites plaies. Appliquer l'eau oxygénée 10 volumes pure sur les petites hémorragies par plaies superficielles.

#### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

## FORME PHARMACEUTIQUE ET CLASSE PHARMACO THÉRAPEUTIQUE Solution pour application locale. Antiseptique. (D. DERMATOLOGIE).

#### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

#### ATTENTION

Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament







EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Ne pas utifiser sous pansement occlusif.

- La solution doit être utilisée immédiatement après ouverture du conditionnement.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas employer l'eau oxygénée en même temps qu'une autre solution antiseptique.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins génants : il est possible que surviennent des sensations de picotements sur les plaies, ceci est sans conséquence et ne doit pas faire modifier

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ SUR CET ÉTUI.

#### PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25 °C à l'abri de la lumière. Il doit être utilisé immédiatement après ouverture. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le condition nement extérieur.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE Novembre 2005 Medicament autorisé N° 34009 359 742 97

CONSEILS DE VOTRE PHARMACIEN

