

Duofilm®

Solution pour application locale

Acide salicylique/Acide lactique



Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DUOFILM, solution pour application locale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DUOFILM, solution pour application locale ?
3. Comment utiliser DUOFILM, solution pour application locale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DUOFILM, solution pour application locale ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE DUOFILM, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

KERATOLYTIQUE (D : Dermatologie)

Ce médicament est préconisé pour le traitement des verrues plantaires, des verrues vulgaires de la main et des verrues « mosaïques ».

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DUOFILM solution pour application locale ?

N'utilisez jamais DUOFILM, solution pour application locale dans les cas suivants :

- Intolérance ou allergie à l'acide salicylique.

Faites attention avec DUOFILM, solution pour application locale :

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser pour les verrues du visage et des organes génitaux.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER DUOFILM, solution pour application locale ?

Posologie

Usage externe.

- Savonner et rincer soigneusement l'endroit à traiter. Sécher.
- À l'aide du pinceau, appliquer le liquide sur la verrue sans déborder sur la peau saine.
- L'application est à renouveler tous les jours, de préférence le soir, pendant 6 à 12 semaines environ. Une interruption précoce du traitement peut entraîner des rechutes. Si l'application est effectuée le matin, protéger avec un petit pansement adhésif.
- Tous les 2 ou 3 jours, frotter doucement la surface des verrues avant l'application avec une lime en carton ou une pierre ponce en évitant de faire saigner et de manière à supprimer la partie superficielle rugueuse de la verrue. Si un saignement se produit, arrêter le traitement pendant 3 jours.

Mode d'administration

VOIE CUTANÉE

Fréquence d'administration

1 fois par jour, de préférence le soir au coucher.

Si vous avez pris plus de DUOFILM, solution pour application locale que vous n'auriez dû :

Risque de brûlures en cas de surdosage.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DUOFILM, solution pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

L'utilisation de ce produit peut entraîner des phénomènes d'irritation accompagnés parfois de sensation de brûlure et de formation de croûtes. Dans ce cas, arrêter rapidement les applications et consulter le médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Site internet : www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

7023H

5. COMMENT CONSERVER DUOFILM solution pour application locale?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser DUOFILM, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.
Produit inflammable: bien refermer le flacon après utilisation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient DUOFILM solution pour application locale ?

Les substances actives sont :

Acide salicylique	16,7 g
Acide lactique	16,7 g

pour 100g de solution pour application locale

Les autres composants sont : Collodion souple : Iulmicoton, alcool à 90 pour cent v/v, éther.

Qu'est ce que DUOFILM, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale.

Flacon de 15 ml.

Titulaire

STIEFEL LABORATORIES (IRELAND) LTD

FINISKLIN BUSINESS PARK

SLIGO

IRLANDE

Exploitant

GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC

100, ROUTE DE VERSAILLES

CS 80001

78164 MARLY LE ROI CEDEX

Fabricant

STIEFEL LABORATORIES LTD

FINISKLIN BUSINESS PARK

SLIGO

IRLANDE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est janvier 2014.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'ANSM (France).

CONSEILS D'UTILISATION

TOUS LES JOURS :

Savonner et rincer soigneusement l'endroit à traiter. Sécher.

En cas de verrue rebelle, il est conseillé de tremper la verrue dans l'eau tiède pour faciliter le traitement.



A l'aide du pinceau, appliquer chaque jour la solution de DUOFILM sur la verrue en veillant à bien la recouvrir de produit. Le pinceau permet une application précise de DUOFILM sur la verrue évitant le débordement sur la peau saine. Si l'on craint malgré tout de déborder, il est possible d'appliquer du vernis à ongles incolore autour de la verrue.



Laisser sécher jusqu'à apparition d'une pellicule blanche.

Si la verrue est située sur une partie du corps exposée aux frottements, il est préférable de la protéger à l'aide d'un petit pansement adhésif.



TOUS LES 2 OU 3 JOURS :

Avant l'application de DUOFILM, frotter doucement la surface de la verrue avec une lime en carton ou une pierre ponce afin d'éliminer la partie superficielle rugueuse de la verrue. Eviter de faire saigner. En cas de saignement, arrêter le traitement pendant 3 jours.



RECOMMANDATIONS :

- Bien refermer le flacon après usage pour éviter l'évaporation de la solution DUOFILM.
- Le traitement doit être effectué chaque jour et poursuivi selon les indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Une interruption précoce du traitement peut entraîner des rechutes.
- Les verrues peuvent être contagieuses : assurez-vous que personne n'utilise votre serviette.
- Ne pas utiliser pour les verrues du visage ou des organes génitaux.

 Stiefel

7023H

