

## ECONAZOLE TEVA® L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée

Nitrate d'éconazole

### NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### DANS CETTE NOTICE :

1. Qu'est-ce que ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?
3. Comment prendre ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?
6. Informations supplémentaires.

### 1 QU'EST-CE QUE ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du nitrate d'éconazole : un antifongique et antibactérien.

Il est indiqué dans le traitement local des mycoses (affections dues à des champignons microscopiques) de la vulve et du vagin parfois surinfectés.

**TEVA**

### 2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?

**Ne prenez jamais ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée dans les cas suivants :**

- allergie à l'un des composants du produit (voir composition) ou à une substance apparentée (appartenant au groupe des imidazolés),
- utilisation avec un diaphragme en latex.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Faites attention avec ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée :**

Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du traitement d'ensemble. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs favorisants par votre médecin est indispensable.

**Ne pas utiliser un savon acide pour l'hygiène locale, l'acidité favorisant la prolifération des champignons** (voir les Conseils pratiques de la rubrique : Comment prendre ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?).

Ce traitement peut entraîner des sensations de brûlures locales et une augmentation des démangeaisons. Généralement, ces phénomènes cèdent spontanément à la poursuite du traitement. Si les symptômes persistent au delà de 24 à 48 heures, interrompez le traitement et consultez votre médecin.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne pas utiliser avec des produits spermicides (risque d'inactivation) ni avec un diaphragme en latex (risque de rupture du diaphragme).

**Grossesse et Allaitement**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

050489 A

060989 V

### 3 COMMENT PRENDRE ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?

#### Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Dans la majorité des cas, 1 ovule de préférence le soir au coucher, en administration unique.

Dans certains cas, votre médecin peut vous prescrire un ovule le soir et un ovule le lendemain matin.

**Si vous avez l'impression que l'effet de ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.**

#### Mode d'administration

Voie vaginale.

Introduire profondément l'ovule dans le vagin, de préférence en position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.

#### Conseils pratiques :

- toilette avec un savon pH neutre ou alcalin,
- afin de ne pas contaminer votre entourage, utiliser votre propre linge de toilette (gant, serviette),
- votre médecin pourra :
  - traiter également votre partenaire sexuel, afin d'éviter qu'il ne vous recontamine,
  - vous prescrire un antifongique à appliquer localement,
- porter des sous-vêtements en coton,
- éviter les douches vaginales,
- ne pas interrompre le traitement pendant les règles,
- éviter de porter des tampons internes pendant le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### 4 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- réactions au site d'application tels que sensations de brûlures, irritations, démangeaisons et érythème (rougeur de la peau),
- dermatites de contact (inflammation de la peau) et urticaire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5 COMMENT CONSERVER ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée après la date de péremption mentionnée sur la boîte, la plaquette.

A conserver à une température ne dépassant pas +30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée ?**

**La substance active est :**

Nitrate d'éconazole.....150 mg

Pour un ovule à libération prolongée.

**Les autres composants sont :**

Galactomannane, silice colloïdale anhydre, glycérides hémissynthétiques solides, énantate de stéaryle.

**Qu'est ce que ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme d'ovule à libération prolongée. Boîte de 1 ovule.

**Titulaire/ Exploitant**  
TEVA SANTÉ

Immeuble Le Palatin 1  
1, cours du Triangle  
92936 Paris La Défense Cedex

**Fabricant**  
TEVA SANTÉ  
Rue Bellocier  
89107 Sens

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est mars 2009.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**TEVA**

ECONOV/NOT/2