

# EUPHRASIA 3DH WELEDA

collyre en solution en récipient unidose



WELEDA

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. Qu'est-ce qu'EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?
3. Comment utiliser EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose est un médicament homéopathe traditionnellement utilisé en cas d'irritation ou de gêne oculaire avec rougeur ou larmolement, sensation de brûlure, d'origine allergique ou physique :

- Fatigue ou surmenage oculaire : travail sur écran, jeux vidéo, télévision...
- Bain en piscine ou en eau de mer
- Exposition au vent, pollens, atmosphère polluée, fumée, poussière...

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?

### N'utilisez jamais EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose :

- Chez l'enfant de moins d'un an.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) à Euphrasia ou à l'un des autres composants contenus dans EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose.

### Faites attention avec EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose :

- A réserver aux affections mineures. Si les symptômes augmentent ou persistent plus de deux jours, consulter un médecin.
- Pour les porteurs de lentilles de contact : instiller le collyre 15 minutes avant la pose des lentilles.

### Utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement :

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesures de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

**Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines :**


Les effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n'ont pas été étudiés. Toutefois, en cas d'effets indésirables oculaires pouvant gêner la conduite ou l'utilisation de machines, il convient d'attendre que les symptômes régressent avant de conduire ou d'utiliser des machines.

**3. COMMENT UTILISER EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?****Posologie :**

- Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 1 an.
- 1 goutte dans chaque œil 3 fois par jour.
- Se laver soigneusement les mains avant chaque utilisation.
- Détacher un flacon unidose de la barrette. Ouvrir l'unidose en tournant l'embout.
- Tirer la paupière inférieure vers le bas en regardant vers le haut et laisser tomber une goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival inférieur (entre la paupière et l'œil). Ne pas toucher les paupières ou les cils ou la surface de l'œil avec l'embout de l'unidose. Clignez plusieurs fois des yeux pour s'assurer d'une bonne diffusion de la solution sur toute la surface de l'œil.
- Un même flacon peut être utilisé pour les deux yeux.

**Mode d'administration :**

Voie ophtalmique.



Utiliser le flacon immédiatement après ouverture. Jeter le flacon après usage.

**Durée du traitement :**

La durée du traitement ne doit pas dépasser 10 jours.

**Si vous oubliez d'utiliser EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

**Si vous arrêtez d'utiliser EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose** ou si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des réactions d'irritations oculaires telles que sensations de brûlures, œil rouge, démangeaisons, gonflements ou augmentation de la sécrétion lacrymale ont été rapportées. Leur fréquence d'apparition n'est pas connue.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**5. COMMENT CONSERVER EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?**

Tenir ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose après la date de péremption mentionnée sur la boîte et le flacon.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas conserver un flacon après ouverture.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

**6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose ?**

**La substance active est :**

Euphrasia 3DH

**Les autres composants sont :**

Chlorure de sodium, phosphate monosodique monohydraté, phosphate disodique dihydraté, eau pour préparations injectables.

**Qu'est-ce que EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur ?**

L'emballage contient 2 barrettes de 5 flacons unidoses de 0,4 ml d'EUPHRASIA 3DH WELEDA, collyre en solution.

**Titulaire**

LABORATOIRE WELEDA  
9, rue Eugène Jung  
CS 20152  
68331 HUNINGUE Cedex – France  
[www.weleda.fr](http://www.weleda.fr)

**Exploitant**

LABORATOIRE WELEDA SA  
9, rue Eugène Jung  
CS 20152  
68331 HUNINGUE Cedex – France  
[www.weleda.fr](http://www.weleda.fr)

**Fabricant**

LABORATOIRE WELEDA SA  
9, rue Eugène Jung  
CS 20152  
68331 HUNINGUE Cedex – France  
[www.weleda.fr](http://www.weleda.fr)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : février 2014

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

**RECYCLAGE**

Le Laboratoire Weleda cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Le Laboratoire Weleda participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non.

Le Laboratoire Weleda vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

**BRILLE**

La notice en braille ou en caractères agrandis est disponible gratuitement en appelant le numéro vert de Handicap Zéro : 0 800 39 39 51 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine).