

**FR**

# Fluidabak 1,5 %

## Collyre en solution

### Povidone

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution ?
3. COMMENT UTILISER FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### 1. QU'EST-CE QUE FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

##### AUTRES MÉDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES

Ce collyre est indiqué dans le traitement symptomatique de la sécheresse oculaire.

#### 2. QUELLES SONT LES

#### Mode d'administration

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

- Ne pas injecter. Ne pas avaler.
- 1) Laver vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation.
  - 2) Éviter le contact de l'embout du flacon avec l'œil ou les paupières.
  - 3) Instiller 1 goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur dans l'œil à traiter en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas.
  - 4) Reboucher le flacon après utilisation.

#### Si vous oubliez de prendre FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution :

Instillez une goutte de collyre si besoin, dès que vous constatez cet oubli. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Occasionnellement : sensation transitoire de brûlure ou d'œil collé.
- Rarement : réactions d'irritation ou d'hypersensibilité.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### 5. COMMENT CONSERVER FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

**Avant ouverture :** pas de précautions particulières de conservation.

**Après ouverture :** le collyre peut être conservé 12 semaines.

Notez en clair, la date d'ouverture sur l'emballage.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec

#### INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution ?

N'utilisez jamais FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution :

- Si vous êtes allergique à l'un des composants de ce médicament.

#### Faites attention avec FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution :

- Ne pas injecter, ne pas avaler.
- En cas de persistance des symptômes, consultez votre médecin.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, instillez les collyres à 15 minutes d'intervalle.
- Évitez de toucher l'œil avec l'embout du flacon.
- Rebouchez le flacon après utilisation.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Grossesse

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Il est déconseillé de conduire ou d'utiliser des machines, si votre vision se trouble lors de l'instillation du collyre.

#### 3. COMMENT UTILISER FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution ?

##### Posologie

Instillez 1 goutte de collyre, 4 à 6 fois par jour, si la fréquence et la gravité des symptômes le nécessitent.

les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution ?

La substance active est :

Povidone.....1,500 g  
Pour 100 ml.

#### Les autres composants sont :

Chlorure de sodium, phosphate disodique dodécylhydraté, phosphate monosodique dihydraté, eau pour préparations injectables.

#### Qu'est-ce que FLUIDABAK 1,5 % collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme d'un collyre en solution. Flacon compte-gouttes de 10 ml.

#### Titulaire

LABORATOIRES THEA

12, RUE LOUIS BLERIOT

Z.I. DU BREZET

63017 CLERMONT FERRAND

CEDEX 2 - FRANCE

#### Exploitant

LABORATOIRES THEA

12, RUE LOUIS BLERIOT

Z.I. DU BREZET

63017 CLERMONT FERRAND

CEDEX 2 - FRANCE

#### Fabricant

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A.

VIA E. FERMI, 50

20019 SETTIMO MILANESE

ITALIE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 03/2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Ansm (France).



Les Laboratoires THEA coisnt à Adéthe, pour les emballages de médicaments vendus en officine.

Les Laboratoires THEA participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les Laboratoires THEA vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

