

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

  
**Hexomédine®**  
**Transcutanée 1,5 pour mille** solution pour application locale  
diisétionate d'hexamidine

**SANOFLI**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale ?
3. Comment utiliser HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale ?
6. Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ANTISEPTIQUE (D : dermatologie)

Antiseptique de la famille des diamidines.  
Antiseptie des petites plaies superficielles et traitement local d'appoint d'une éventuelle surinfection de la peau.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale ?

**N'utilisez jamais HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale dans les cas suivants :**

- antiseptie avant prélèvement (ponction, injection).
- désinfection du matériel médico-chirurgical.
- en cas d'allergie à l'hexamidine ou à l'un des composants de la solution.
- ne pas utiliser sur les plaies ouvertes ou sur les muqueuses.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Faites attention avec HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale**

### Mises en garde spéciales

Ne pas utiliser sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau brûlée, une peau de prématuré, de nourrisson.

Ce médicament contient du propylène glycol et peut induire des irritations de la peau.

### Précautions d'emploi

Dès l'ouverture du flacon, une contamination microbienne est possible.

Veiller à ne pas garder trop longtemps un flacon d'antiseptique entamé (cf. rubrique posologie).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### Prise ou utilisation d'autres médicaments

Éviter l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques différents avec cet antiseptique (notamment l'utilisation préalable de savon doit être suivie d'un rinçage soigneux).

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Excipient à effet notoire :** propylène glycol.

## 3. COMMENT UTILISER HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale ?

### Posologie

Ne pas avaler.  
Utiliser pure 2 fois par jour en badigeonnages ou en bains locaux.

Dans les infections de l'ongle et du pourtour de l'ongle, la solution peut être utilisée :

- soit en pansement humide de courte durée (30 à 45 minutes)
- soit en bain de 1 à 3 minutes (Le flacon à large goulot est prévu pour cet emploi).

Dans ce cas, il ne faut ni utiliser la solution pour un autre usage antiseptique, ni conserver le flacon après usage.

Le rinçage après application est inutile.

Bien refermer le flacon.

**Durée d'utilisation après ouverture :**

- 15 jours si l'utilisation est faite dans des conditions hygiéniques (le produit est déposé sur une compresse stérile avant l'application sur la partie à traiter).
- 15 jours maximum, si la partie à traiter est plongée dans le flacon (bains locaux pour une affection de l'ongle).

**Mode et voie d'administration**

Voie cutanée.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Réactions allergiques locales possibles : rougeur, irritation, démangeaisons, sécheresse cutanée.
- Des réactions allergiques plus importantes peuvent parfois survenir. Elles régressent lentement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### 5. COMMENT CONSERVER HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Après première ouverture : le produit se conserve 15 jours maximum (5 jours en cas d'utilisation en bains locaux pour une infection unguéale).

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

**Que contient HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale ?**

**La substance active est :**

Di-isonate d'hexamidine ..... 0,150 g  
pour 100 ml de solution pour application locale.

**Les autres composants sont :**

Propylèneglycol, méthylal, nonoxynol, alcool éthylique à 96,5°, eau purifiée.

**Qu'est-ce que HEXOMÉDINE TRANSCUTANÉE 1,5 POUR MILLE, solution pour application locale et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale. Flacon de 45 ml.

**Titulaire et exploitant**

sanofi-aventis France  
1-13, boulevard Romain Rolland  
75014 Paris - France  
Information Patient : N° vert 0800 222 555  
Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

**Fabricant**

UNITHER LIQUID MANUFACTURING  
Colomiers – France

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est :**

**Octobre 2011/V1.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).