

Voie ophtalmique.

- 1 à 2 gouttes dans chaque œil, 2 à 6 fois par jour.
- Cesser le traitement dès la disparition des symptômes.
Afin d'instiller une solution toujours stérile, utiliser une nouvelle unidose lors de chaque application.

Si vous avez l'impression que l'effet d'**HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose** est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous avez pris plus d'HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose que vous n'auriez dû :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, **HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose** est susceptible d'avoir des effets indésirables. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5- COMMENT CONSERVER HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose ?

A conserver à l'abri de la chaleur.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est mai 2009.



Les Laboratoires Boiron participe à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non. Le dispositif mis en place par CYCLAMED ne concerne que la France métropolitaine.

20, rue de la Libération **BOIRON[®]** 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France

PHO. 130F. 06/09

HOMÉOPTIC[®]

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 2 jours de traitement, consultez un médecin.

HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose.

Les substances actives sont :

Euphrasia officinalis 3 DH 1,00 %
Calendula officinalis 3 DH 0,25 %
Magnesia carbonica 5 CH 0,25 %
Pour une dose de 0,4 ml.

Les autres composants sont : chlorure de sodium, eau purifiée.

Titulaire et exploitant :

BOIRON S.A.

20, rue de la Libération - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon - France

Fabricant :

BOIRON

ZAC des Frênes - 1, rue Edouard Buffart - 77144 Montévrain - France

1- QU'EST-CE QU'HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Collyre en récipient unidose sans conservateur.

Sachet de 5 unidoses.

HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé chez l'adulte et l'enfant à partir d'un an, en cas d'irritation ou de gêne oculaire d'origines diverses (effort visuel soutenu, bain de mer ou de piscine, fatigue oculaire, atmosphère enfumée, ...)

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose ?

Ne pas donner HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose aux enfants de moins d'un an.

Prendre des précautions particulières avec HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose :

A réserver aux affections mineures, si les symptômes augmentent ou persistent plus de deux jours, consulter un médecin.

Ne pas utiliser :

- lorsque l'irritation s'accompagne de pus (paupières collées le matin au réveil).
- en cas de douleur vive, de choc direct, de blessure.

Consulter alors rapidement un médecin.

Le port de lentilles de contact est déconseillé pendant toute la durée du traitement.

Grossesse et Allaitement

En l'absence de données expérimentales et cliniques et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

3- COMMENT PRENDRE HOMÉOPTIC[®], collyre en récipient unidose ?



1- Ouvrir le sachet aluminium.



2- Détacher un flacon unidose de la barrette.



3- Ouvrir l'unidose en tournant l'embout.



4- Tirer la paupière inférieure vers le bas tout en regardant vers le haut et déposer une goutte de collyre entre la paupière et l'œil (dans le cul-de-sac conjonctival), en pressant légèrement l'unidose.

5- Fermer soigneusement le sachet contenant les autres unidoses en repliant le côté ouvert.