



Maalox[®]

Maux d'estomac

Suspension buvable en sachet-dose

sanofi aventis

Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes.

Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin. La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre médecin.

Les substances actives sont

Oxyde d'aluminium	230 mg
Sous forme d'oxyde d'aluminium hydraté	460 mg
Hydroxyde de magnésium	400 mg

pour un sachet-dose.

Les autres composants sont

Sirop de saccharose à 64 %, sorbitol à 70 % (non cristallisable), mélange de gomme xanthane et de gomme guar, chlorure de sodium, arôme citron.

Titulaire/Exploitant

sanofi-aventis France - 1-13, boulevard Romain Rolland - 75014 Paris - France

Information médicale : N° vert 0800 222 555

Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant

sanofi-aventis S.p.A. - Viale Europa, 11 - 21040 Origgio (VA) - Italie

QU'EST-CE QUE MAALOX[®] MAUX D'ESTOMAC, suspension buvable en sachet-dose ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Boîte de 20 sachets-doses.

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans) dans les brûlures d'estomac et remontées acides.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE MAALOX[®] MAUX D'ESTOMAC, suspension buvable en sachet-dose ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ en cas :

- d'antécédents d'allergie à l'un des composants du médicament,
- de maladie grave du rein.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Prendre des précautions particulières avec MAALOX[®] MAUX D'ESTOMAC, suspension buvable en sachet-dose :

Mises en garde :

Vous ne devez utiliser ce médicament qu'après avis de votre médecin :

- si vos troubles sont associés à une perte de poids,
- si vous avez des difficultés à avaler ou une gêne abdominale persistante,
- si vous souffrez de troubles de la digestion pour la première fois ou si ces troubles se sont modifiés récemment,
- si vous souffrez d'une maladie des reins.

En raison de la présence de saccharose, de sorbitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi :

En cas de dialyse rénale chronique ou de traitement prolongé, tenir compte de l'apport en aluminium.

Si l'intensité et/ou la fréquence des symptômes persistent sans amélioration ou s'aggravent après 10 jours de traitement, n'augmentez pas la dose mais prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Ce médicament contient 3,15 g de saccharose par sachet-dose : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

RP481806A

Grossesse - Allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Liste des excipients à effet notoire

Saccharose, sorbitol.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Il convient de ne pas prendre au même moment l'antiacide et un autre médicament.

Cet autre médicament pourra être pris à distance de l'antiacide (par exemple 2 heures avant).

Ce médicament contient **des antiacides (hydroxyde d'aluminium et hydroxyde de magnésium)**. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

COMMENT PRENDRE MAALOX® MAUX D'ESTOMAC, suspension buvable en sachet-dose ?

Voie orale.

RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans).

1 à 2 sachets par prise au moment des brûlures d'estomac ou des remontées acides.

Nombre de prises maximales par jour : 6 prises.

Ne pas dépasser 12 sachets par jour.

Malaxer soigneusement le sachet avant ouverture. Absorber la suspension telle quelle sans la diluer.

La durée d'utilisation est limitée à 10 jours

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Possibilité de :

- troubles digestifs (diarrhées ou constipation),
- diminution du taux de phosphore dans le sang en cas d'utilisation prolongée ou à fortes doses.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER MAALOX® MAUX D'ESTOMAC suspension buvable en sachet-dose ?

Pas de précaution particulière de conservation.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : juin 2007

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

Ce médicament a pour but de soulager vos maux d'estomac.

Les brûlures d'estomac, les remontées acides peuvent être dues à des modifications de l'alimentation (mets acides ou épicés, boissons alcoolisées...) ou à la prise de certains médicaments (aspirine, anti-inflammatoires...). N'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Afin de limiter l'apparition des symptômes, respectez autant que possible, les règles d'hygiène suivantes :

- évitez les repas abondants et riches en graisses,
- évitez certains aliments tels que chocolat, épices, piments, jus d'agrumes, boissons gazeuses,
- variez votre alimentation,
- normalisez votre poids et faites de l'exercice,
- évitez la pratique d'un effort important juste après le repas,
- évitez le tabac et limitez la consommation d'alcool.

VOTRE PHARMACIEN, VOTRE MEDECIN, CONNAISSENT BIEN LES MEDICAMENTS.

N'HESITEZ PAS À LEUR DEMANDER DES PRECISIONS.

NE LAISSEZ JAMAIS UN MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Pour toute demande de notice en braille, contacter notre département d'information médicale et scientifique au N° Vert 0800 222 555 ou au +33 1 57 63 23 23 (appel depuis l'étranger)

RP481806A

