



**MONAZOL<sup>®</sup>**  
2% CRÈME  
NITRATE DE SERTACONAZOLE

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**  
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.  
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.  
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE MONAZOL 2%, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MONAZOL 2%, crème?
3. COMMENT UTILISER MONAZOL 2%, crème?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER MONAZOL 2%, crème?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**1. QU'EST-CE QUE MONAZOL 2%, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**Classe pharmacothérapeutique**

Antifongique de la classe des imidazolés

**Indications thérapeutiques**

Ce médicament est un antifongique, de la famille des imidazolés, préconisé dans le traitement des mycoses cutanéomuqueuses à Candida et à dermatophytes.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE**

**MONAZOL 2%, crème?**

**Contre-indications**

**N'utilisez jamais MONAZOL 2%, crème :**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas d'hypersensibilité connue à un antimycosique du groupe des imidazolés ou l'un des excipients.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Précautions d'emploi : mises en garde spéciales**

Faites attention avec MONAZOL 2%, crème :

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Interactions avec d'autres médicaments**

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

**Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement**

**Grossesse/Allaitement**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS À VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

**Liste des excipients à effet notoire**

Parahydroxybenzoate de méthyle

**3. COMMENT UTILISER MONAZOL 2%, crème?**

**Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

**Posologie**

Une application par jour.

**Mode et voie d'administration**

Après lavage et séchage des lésions, appliquer la crème sur la lésion et en périphérie sur 1 cm.

**Conseils d'hygiène**

Effectuer votre toilette avec un savon à pH neutre ou alcalin, un savon à pH acide favorisant la multiplication des Candida.

Porter si possible des sous-vêtements en coton et éviter tous les facteurs favorisant la prolifération des champignons.

**Durée de traitement**

Dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription médicale

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

**Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments MONAZOL 2%, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Des manifestations d'intolérance locales, telles que des démangeaisons ou l'apparition de rougeurs ont été signalées dans de rares cas.

L'absence de passage du sertaconazole dans la circulation générale lors de l'application de la crème sur une peau saine et lésée ou sur la muqueuse vaginale rend peu probable l'apparition d'effets indésirables plus importants.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

**5. COMMENT CONSERVER MONAZOL 2%, crème?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MONAZOL 2%, crème après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur

Pas de précautions particulières de conservation

**Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

**6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

**Que contient MONAZOL 2%, crème ?**

**La substance active est :**

Nitrate de sertaconazole ..... 2,00 g

pour 100 g de crème

**Les autres composants sont :**

Stéarate de polyoxyéthylène glycol et éthylène glycol (TEFOSE 63), macroglycérides lauriques (LAM 2130 CS / LABRAFIL M 2130 CS), isostéarate de glycérol (PECEOL ISOSTEARIQUE), paraffine liquide légère, acide sorbique, parahydroxybenzoate de méthyle, eau purifiée.

**Qu'est-ce que MONAZOL 2%, crème te contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de crème. Tube de 15g

**Titulaire / Fabricant / Exploitant**

LABORATOIRE THERAMEX - 6, avenue Albert II - BP 59 - 98007 MONACO cedex.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 17 mars 2011.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

