

Onctose

Hydrocortisone

Crème

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si des symptômes s'aggravent ou persistent après quelques jours, consultez un médecin.

COMPOSITION :

Acétate d'hydrocortisone	0,250 g
Chlorhydrate de lidocaïne	1,000 g
Méthylsulfate de méthénidamium	2,000 g

Excipients : cire émulsionnable non ionique ou cétomacrogol 1000, stéarate de diéthylène glycol, propylène glycol, eau purifiée

Pour 100 g de crème

Tube de 30 g de crème

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :

DERMOCORTICOSTÉROÏDE - ANTIHISTAMINIQUE - ANESTHÉSISQUE LOCAL (D : Dermatologie)

MERCK Médication Familiale - 18 C, bd Winston Churchill - 21000 DIJON

Fabricant : FAMAR - 29, avenue Général de Gaulle - 69230 SAINT GENIS LAVAL

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

ONCTOSE HYDROCORTISONE est préconisée en cas de démangeaisons, en particulier piqûres d'insectes.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants : • anticédant d'allergie aux anesthésiques locaux, aux antihistaminiques ou à l'hydrocortisone, • sur des plaies, des lésions cutanées suintantes ou ulcérées, • sur une acné, • sur une rosacée, • sur une peau infectée, que l'origine soit bactérienne (par exemple impétigo), virale (herpès, zona, varicelle), mycosique (due à des champignons microscopiques) ou parasitaire.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES : La démangeaison n'est qu'un symptôme qui peut avoir des causes multiples nécessitant l'avis de votre médecin en particulier en cas de persistance ou d'aggravation des troubles.

Ne pas appliquer sur une grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée, ou chez le nourrisson ou le jeune enfant en raison du risque de passage du principe actif dans le sang.

Ne pas appliquer sur les muqueuses.

Éviter l'application du produit à proximité des yeux, chez l'enfant, l'application sur la face devra être limitée, un contact accidentel avec les yeux étant possible.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours de traitement, prenez l'avis de votre médecin.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN.

SPORTIFS : l'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS : Propylène glycol.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE : Adulte et enfant de plus de 30 mois. Voir cutanée. 1 application 2 à 3 fois par jour. Bien se laver les mains après chaque utilisation.

DURÉE DU TRAITEMENT : En cas de persistance des troubles après 3 jours de traitement, consultez votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS : Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : • risque d'allergie à un composant de la crème, • risque d'amaigrissement de la peau, de dilatation de petits vaisseaux sanguins, de vergetures, de poussée d'acné, de rougeurs et d'irritations autour de la bouche, • risque de mydriase (dilatation excessive de la pupille) en cas d'application trop proche des yeux notamment chez l'enfant. Cet accident est spontanément résolu en moins de 24 heures. • des cas de développement exagéré du système pileux, de trouble de la coloration de la peau, d'infection secondaire en particulier en cas de traitement prolongé sous pansement occlusif ou dans les plis ont été rapportés. Ce médicament contient du propylène glycol et peut induire des irritations de la peau. **SIGNEZ À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION : À conserver à une température inférieure à 25 °C.

DATE DE DERNIÈRE RÉVISION DE LA NOTICE : Juin 2006.



En France métropolitaine, MERCK Médication Familiale participe à CYCLAMOD, association chargée de la collecte et l'élimination des déchets de médicaments. MERCK Médication Familiale vous remercie en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.

MERCK Médication Familiale
18 C, bd Winston Churchill - 21000 DIJON