

Oxyboldine®

DIGESTIONS DIFFICILES

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

- 1 - Qu'est-ce que OXYBOLDINE, comprimé effervescent et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OXYBOLDINE, comprimé effervescent ?
- 3 - Comment prendre OXYBOLDINE, comprimé effervescent ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver OXYBOLDINE, comprimé effervescent ?
- 6 - Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE OXYBOLDINE, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Cholagogue-Cholérétique
Ce médicament est préconisé en traitement d'appoint des digestions difficiles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OXYBOLDINE, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ?

Ne prenez jamais OXYBOLDINE, comprimé effervescent en cas de :

- Hypersensibilité à OXYBOLDINE ou à l'un de ses composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec OXYBOLDINE, comprimé effervescent :

Précautions d'emploi

- UTILISER AVEC PRECAUTION en cas d'obstruction des voies biliaires ou de grave maladie du foie.
- Ce médicament contient 470 mg de sodium par comprimé. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.
- En cas de diarrhée ou de douleurs abdominales, arrêter le traitement et CONSULTER VOTRE MÉDECIN.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire : sels de sodium : 1 comprimé contient 470 mg de sodium.

3. COMMENT PRENDRE OXYBOLDINE, comprimé effervescent ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE.

Dissoudre dans un verre d'eau, 1 comprimé, avant les 3 principaux repas ou au moment des troubles.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

1 à 3 comprimés par jour au moment des repas ou au moment des troubles.

Durée du traitement

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

NE PAS UTILISER DE FAÇON PROLONGÉE SANS AVIS MÉDICAL.

Instructions en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, OXYBOLDINE, comprimé effervescent est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- risque de diarrhée à fortes doses,
- de rares cas de réactions cutanées ont été rapportés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER OXYBOLDINE, COMPRIMÉ EFFERVESCENT ?

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Ne pas utiliser OXYBOLDINE, comprimé effervescent après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

A conserver à l'abri de l'humidité.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient OXYBOLDINE, comprimé effervescent ?

Les substances actives sont :

Boldine	0,5 mg
Sulfate de sodium anhydre	54,0 mg
Dihydrogénophosphate de sodium	132,0 mg
Pour un comprimé effervescent.	

Les autres composants sont :

Benzoate de sodium, huile essentielle d'anis, acide tartrique, acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, 1 comprimé contient 470 mg de sodium.

Qu'est-ce que OXYBOLDINE, comprimé effervescent et contenu de l'emballage extérieur ?
Comprimé effervescent en tube. Boîte de 2 tubes de 12 comprimés.

Titulaire / Exploitant :

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE

Place Lucien Auvert

77020 Melun Cedex - France

Fabricant :

CATALENT GERMANY SCHORNDORF GMBH

Steinbeisstrasse 1 und 2

73614 Schorndorf - Allemagne

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 12 novembre 2009.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

Liste des excipients à effet notoire : sels de sodium : 1 comprimé contient 470 mg de sodium.



Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX

PCD278675