



# Rhinédrine

RHINOPHARYNGITE - RHUME

8N796A00

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### DENOMINATION :

RHINEDRINE, solution pour pulvérisation nasale.

### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Bromure de benzododécinium ..... 0,0503 g  
Excipients : Camphre racémique, chlorure de sodium, polysorbate 80, eau purifiée pour 100 ml de solution

**FORME PHARMACEUTIQUE :** Solution pour pulvérisation nasale - Flacon de 13 ml.

**CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :** PREPARATION NASALE POUR USAGE LOCAL. (R : système respiratoire)

### TITULAIRE / EXPLOITANT :

COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE  
Place Lucien Auvert - 77020 MELUN CEDEX - FRANCE



### FABRICANT :

FARMACLAIR - 440 Av du Général de Gaulle - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

### DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament est indiqué en cas de rhume et de rhinopharyngite.

### ATTENTION !

#### DANS QUELS CAS NE DEVEZ-VOUS PAS UTILISER CE MEDICAMENT :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE :

- en cas d'allergie aux antiseptiques de la classe des ammoniums quaternaires lors d'une précédente utilisation,
- chez le nourrisson de moins de 30 mois.

En raison de la présence en tant qu'excipients de dérivés terpéniques, ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- nourrissons de moins de 30 mois,
- enfants ayant eu des convulsions dues à la fièvre ou non.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### MISES EN GARDE SPECIALES :

Dès l'ouverture du conditionnement, et a fortiori dès la première utilisation d'une préparation à usage nasal, une contamination microbienne est possible.

Cette spécialité contient en tant qu'excipients des dérivés terpéniques, qui peuvent entraîner à doses excessives :

- des accidents à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant,
- des pauses respiratoires et des malaises chez le nourrisson.

1



Respecter les conseils d'utilisation, en particulier :

- ne jamais dépasser les doses recommandées (Cf. rubrique POSOLOGIE),
- respecter les durées de traitement préconisées,
- pulvériser ce médicament en tenant le flacon bien vertical, l'embout vers le haut.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de fièvre, maux de tête importants, douleur de l'oreille ou autres symptômes associés, consultez votre médecin.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

#### GROSSESSE - ALLAITEMENT :

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

#### LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :

Dérivés terpéniques. En cas de non-respect des doses préconisées :

- risque de convulsions chez l'enfant et chez le nourrisson,
- possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.

#### COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT :

##### POSOLOGIE :

Réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 30 mois :

Adulte : 2 pulvérisations dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.

Enfant de plus de 30 mois : 1 pulvérisation dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.

**MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :** Voie nasale.

**DUREE DU TRAITEMENT :** Le traitement ne devra pas dépasser quelques jours.

#### EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS, notamment allergie à type d'éternuements, écoulement nasal ou réaction cutanée.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

**CONSERVATION :** NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.**

**DATE DE REVISION DE LA NOTICE :** janvier 1997

8N796A00

2