

# Strepsils®



LIDOCAINE, pastille

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement, votre maladie.**

**Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien ou à votre médecin.**

Ce médicament est une spécialité d'Automédication, qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **Dans cette notice :**

1. Qu'est ce que Strepsils lidocaïne, pastille et dans quel cas est il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Strepsils lidocaïne, pastille ?
3. Comment prendre Strepsils lidocaïne, pastille ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Strepsils lidocaïne, pastille ?
6. Informations supplémentaires.

### **1. QU'EST-CE QUE STREPSILS LIDOCAINE, PASTILLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

#### **PREPARATIONS POUR LA GORGE**

Ce médicament contient un anesthésique local (le chlorhydrate de lidocaïne) et deux antiseptiques locaux (l'amylnmétacresol et l'alcool 2,4-dichlorobenzilyque).

Il est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans en cas de maux de gorge peu intenses sans fièvre, d'aphtes, de petites plaies de la bouche.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STREPSILS LIDOCAINE, PASTILLE ?**

**VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE** ce médicament en cas d'antécédents d'allergie aux anesthésiques locaux ou aux autres composants de la pastille.

**EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

**Prendre des précautions particulières avec STREPSILS LIDOCAINE, pastille :**

#### **Mises en garde**

**NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS**

L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments.

Il est donc impératif :

- De n'utiliser ce médicament qu'avec précaution chez l'enfant de moins de 12 ans,
- De ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou avant la prise de boisson.

L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux avec possibilité de convulsions et sur le cœur. En raison de la présence de glucose et de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

#### **Précautions d'emploi**

- Mal de gorge  
En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**
- Aphtes, petites plaies de la bouche  
En cas de lésions étendues, d'extension des lésions, d'apparition de fièvre : **CONSULTEZ IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN.**

Ce médicament contient 2,5 g de sucre par pastille : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Ce médicament contient de l'amylnmétacresol, de l'alcool 2,4-dichlorobenzilyque et un anesthésique local (la lidocaïne). D'autres médicaments en contiennent : ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir posologie et mode d'administration)

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

### Grossesse Allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.  
En l'absence de données sur cette association, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser STREPSILS LIDOCAINE pendant la grossesse.  
La prise de ce médicament est possible au cours de l'allaitement.  
DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

### Sportifs

L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

### Informations importantes concernant certains composants de STREPSILS LIDOCAINE, pastille

Liste des excipients à effet notoire: glucose, saccharose.

### 3. COMMENT UTILISER STREPSILS LIDOCAINE, PASTILLE ?

Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

#### Posologie. Mode d'administration

Adultes :

1 pastille à laisser fondre lentement dans la bouche sans la croquer, à renouveler si nécessaire au bout de 2 heures, sans dépasser 8 pastilles par jour.

Enfant de 6 à 15 ans :

1 pastille à laisser fondre lentement dans la bouche sans la croquer, à renouveler si nécessaire au bout de 2 heures, sans dépasser 4 pastilles par jour.

#### Fréquence d'administration

Prendre les pastilles à distance des repas.

#### Durée du traitement

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

**Si vous avez pris plus de STREPSILS LIDOCAINE, pastille que vous n'auriez dû :**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre STREPSILS LIDOCAINE, pastille :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, STREPSILS LIDOCAINE, pastille est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- Eruptions cutanées : dans ce cas, arrêtez le traitement,
- Possibilité d'engourdissement passager de la langue,
- En cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») il est conseillé d'interrompre le traitement et demander avis à un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER STREPSILS LIDOCAINE, PASTILLE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte

#### Conditions de conservation

Conservez ce médicament à une température ne dépassant pas + 25 °C.

Ne pas utiliser si vous constatez des signes visibles de détérioration tels que des pastilles fondues.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATION SUPPLEMENTAIRES

#### Que contient Strepsils lidocaïne, pastille ?

Les substances actives sont

Amylmétacrésol.....	0,6 mg
Alcool 2,4-dichlorobenzyle.....	1,2 mg
Chlorhydrate de lidocaïne.....	2,0 mg

Pour une pastille

#### Les autres composants sont

Huile essentielle de menthe poivrée, huile essentielle de badiane, lévomenthol, indigotine, jaune de quinoléine, saccharine sodique, acide tartrique, solution de saccharose, glucose liquide.

#### Qu'est ce que Strepsils lidocaïne, pastille et contenu de l'emballage extérieur ?

Boite de 24 pastilles à sucer



#### Titulaire /Exploitant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE  
15, RUE AMPÈRE  
91748 MASSY CEDEX

#### Fabricant

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD  
THANE ROAD, NOTTINGHAM  
NOTTINGHAMSHIRE NG90 2DB (GB)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est septembre 2010

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Asssaps (France).

0306022

