

SYNTHOL

LIQUIDE*

*Solution pour application cutanée et bain de bouche.

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE SYNTHOL, Liquide ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SYNTHOL, Liquide ?
3. COMMENT UTILISER SYNTHOL, Liquide ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER SYNTHOL, Liquide ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE SYNTHOL, Liquide ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

AUTRES MÉDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT ORAL LOCAL (ADULTES)

Ce médicament est préconisé, CHEZ L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 7 ANS :

- En application cutanée, en traitement d'appoint des :
 - troubles bénins : bleus, coups
 - piqûres d'insectes
- En bain de bouche, en traitement local d'appoint des affections de la bouche :
 - aphtes
 - gingivites (inflammations des gencives)
 - stomatites (inflammations de la muqueuse de la bouche)
 - parodontopathies (affections du tissu de soutien des dents)

1

00889808

3

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SYNTHOL, Liquide ?

N'utilisez jamais SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche, dans les cas suivants :

- Antécédent d'allergie aux salicylés, à un médicament apparenté (AINS, aspirine) ou à un autre des constituants.
- Enfant ayant eu des antécédents de convulsions dues à la fièvre ou non, en raison de la présence de dérivés terpéniques (lévomenthol).
- Ne pas appliquer sur les yeux, sur une peau lésée quelle que soit la lésion : lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

Faites attention avec SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche :

Ce médicament est **RÉSERVÉ À L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 7 ANS.**

Pour l'utilisation en bain de bouche : l'usage prolongé de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche, de la gorge.

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques (lévomenthol) qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents à type de convulsions chez l'enfant.

Respectez les conseils d'utilisation :

- ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée (Voir 3. COMMENT UTILISER SYNTHOL, Liquide ?),
- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- respecter la fréquence et la durée du traitement préconisées,
- ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 7 ans.

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, **DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.**

Pour l'utilisation en bain de bouche : en cas d'aggravation des symptômes ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours, **CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.**

Après application, il est nécessaire de se laver les mains pour éviter tout contact involontaire du produit avec les yeux.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et en aucun cas, il ne devra être appliqué sur les seins. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Excipient à effet notoire : Alcool.

2

8N698B00

1

3. COMMENT UTILISER SYNTHOL, Liquide ?

MODE D'ADMINISTRATION : voie buccale et cutanée. Ne pas avaler.

POSOLOGIE/FREQUENCE D'ADMINISTRATION : 2 à 3 fois par jour.

Utilisation cutanée en frictions ou en compresses (traumatismes bénins ou piqûres d'insectes) :

- En frictions, le produit est utilisé pur.
- En compresses, diluer ce produit à 50% avec de l'eau. Le temps d'application de la compresse imprégnée de la solution diluée sur la peau varie de 1/2 heure à 1 heure maximum.

Utilisation en bain de bouche (affections de la bouche) :

- Diluer ce produit à 10%, soit 1 cuillère à soupe dans un verre d'eau.

Se laver les mains après application.

Si vous avez utilisé plus de SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche, que vous n'auriez dû : rincez abondamment à l'eau.

Si vous oubliez de prendre SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche, : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, SYNTHOL, solution pour application cutanée et bain de bouche est susceptible d'entraîner des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Risque de réaction locale (en application cutanée et en bain de bouche).
- De rares cas d'eczéma de contact nécessitant l'arrêt du traitement ont été rapportés.
- Possibilité de rougeur cutanée au point d'application.
- En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées :
 - risque de convulsion chez l'enfant,
 - possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés.
- En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer des irritations et une sécheresse de la peau.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SYNTHOL, Liquide ?

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le flacon.

Pour le flacon : à conserver dans son emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

Pour le spray : à conserver dans le conditionnement primaire d'origine, à l'abri de la lumière.

Au dessous de +8°C, une légère opalescence peut apparaître. La solution redevient limpide dès que la température ambiante remonte.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Que contient SYNTHOL, liquide ?

Pour 100 g de solution, la composition en substances actives est :

Lévomenthol.....	0,2600 g
Veratrole.....	0,2600 g
Résorcinol.....	0,0210 g
Acide salicylique.....	0,0105 g

Les autres composants sont l'huile essentielle de géranium rosat, l'huile essentielle de cédrat, le jaune de quinine (E 104), l'éthanol à 96%, l'eau purifiée.

Titre alcoolique 34,5% v/v.

Qu'est-ce que SYNTHOL, liquide et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée et bain de bouche. Flacon de 75ml, 115ml, 225ml ou 450ml ou flacon pulvérisateur de 75ml ou 125ml.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE / EXPLOITANT :

GlaxoSmithKline Santé Grand Public
100 route de Versailles - BP 23
78164 Marly-le-Roi Cedex (France)

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT :

Farmaclair
440, avenue du Général de Gaulle
14200 Hérouville Saint-Clair (France)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 10/2008.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'Afssaps (France).

