



# EOSINE COOPER 2 %

## SOLUTION POUR APPLICATION CUTANÉE

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

- Ce médicament est une spécialité d'AUTOMEDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
3. Comment utiliser ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un colorant qui assèche, très faiblement antiseptique. Il est indiqué en cas d'irritation de la peau, notamment en cas d'érythème fessier (fesses rouges) du nourrisson.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?

**N'utilisez jamais ce médicament :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'éosine.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Faites attention avec ce médicament :**

- Ne l'avalez pas.
- Tout flacon unidose entamé doit être utilisé dans les 48 heures pour éviter la contamination par des microbes.

**Irritation cutanée :** en cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours, consultez un médecin ou demandez conseil au pharmacien.

**Fesses rouges du nourrisson :** dans le cas où l'érythème fessier du nourrisson persiste au-delà de 3 jours consultez un médecin ou demandez conseil au pharmacien.

En cas de doute, vous devez demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

**Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

En particulier, évitez d'employer ce médicament en même temps qu'une autre solution pour application locale.

**Grossesse et allaitement :**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement. D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### 3. COMMENT UTILISER ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?

**Posologie, mode et voie d'administration :**

Voie cutanée.

Appliquez localement à l'aide d'une compresse stérile **1 à 2 fois par jour**, ou versez directement sur l'endroit à traiter.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

**Avertissez votre médecin si vous constatez les effets suivants :**

- éruptions localisées de la peau,
- photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux UV) des surfaces traitées par ce médicament.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date limite de péremption mentionnée sur la boîte.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

**Que contient ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?**

**La substance active** est l'éosine disodique. 100 ml de ce médicament en contiennent 2,00 grammes.

**L'autre composant** est l'eau purifiée.

**Comment se présente ÉOSINE COOPER 2 %, solution pour application cutanée en récipient unidose ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application locale, contenue dans des récipients unidoses. Boîte de 10 récipients unidoses de 2 ml.

**Titulaire / Exploitant :**

Coopération Pharmaceutique Française  
Place Lucien Auvert  
77020 MELUN CEDEX

**Fabricant :**

Laboratoire Unither  
Z.I. Longpré - 10, rue André Durouchez  
80084 AMIENS CEDEX 2

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 7 juin 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

### CONSEIL/ÉDUCATION SANITAIRE

Afin de limiter les risques d'apparition d'un érythème fessier du nourrisson, il est nécessaire de :

- changer fréquemment le bébé, au moins 6 fois par jour,
- à chaque change, bien nettoyer les fesses du bébé avec du savon surgras en insistant au niveau des plis puis bien rincer avec de l'eau,
- ne pas mettre de couche sur des fesses humides. Au besoin, séchez soigneusement avec une serviette absorbante propre, sans frotter, afin d'éviter les risques d'irritation.

En cas d'érythème fessier du nourrisson, il est recommandé en outre de laisser les fesses du bébé à l'air le plus souvent et le plus longtemps possible.